

1

10-граммовый (5.07) монофиламент

Оценка сохранности защитной чувствительности

Недоступно  
или результат  
неоднозначен

2

Камертон 128 Гц

Оценка сохранности вибрационной чувствительности

Если  
недоступно

3

Ипсвичский тест с касанием

Оценка чувствительности к легкому прикосновению

Пациент должен сказать (с закрытыми глазами), чувствует ли он («да» / «нет») давление, вибрацию или легкое прикосновение



I палец



Головка I плюсна.кости



Головка V плюсна.кости



Тыл I пальца (дист. фаланга);  
другой палец при отсутствии 1-го



I палец



III палец



V палец

Повторите прикосновение дважды в каждом месте, но сделайте также «ложное» прикосновение, в котором монофиламент не касается кожи (всего 3 вопроса для каждой точки)

- ✓ Для **каждой точки**: чувствительность **сохранена** при правильном ответе на 2 из 3 прикосновений
- ✗ Для **каждой точки**: чувствительность **отсутствует** при неправильном ответе на 2 из 3 прикосновений

- Монофиламент перпендикулярен коже, сила нажатия – достаточная для его сгибания
- Прикосновение длится около 2 секунд
- Продолжительность тестирования: ок. 2 мин на обе стопы

Повторите прикосновение дважды в каждом месте, чередуя с одним «ложным» измерением, при котором камертон не вибрирует

- ✓ Чувствительность **сохранена** при правильном ответе в не менее чем 2 из 3 прикосновений
- ✗ Чувствительность **отсутствует** при 2 или более неправильных ответах

- Необходимое для тестирования время: 3-5 мин на обе стопы

- ✓ Чувствительность **сохранена** при правильном ответе в не менее чем 2 из 3 прикосновений
- ✗ Чувствительность **отсутствует** при 2 и более нераспознанных прикосновениях

- Прикосновение без нажатия, трения или постукивания
- Длительность прикосновения – 1-2 секунды
- Необходимое время: 2 минуты на обе стопы