

# ¿Cómo seleccionar el dispositivo de descarga correcto?

## LOCALIZACIÓN DE LA ÚLCERA DE PIE DIABÉTICO (UPD)

### UPD no plantares

Dispositivo removible hasta tobillo  
Modificaciones en el calzado  
Separadores interdigitales u ortesis



### UPD plantar en antepié o mediopié

¿Existe isquemia o infección?

**Sí**

Infección **LEVE**  
o  
Isquemia **LEVE**

Dispositivo no removible  
hasta rodilla

*Si está contraindicado o no se tolera*

Infección **LEVE + Isquemia LEVE**  
o  
Infección **MODERADA**  
o Isquemia **MODERADA**

Considere utilizar un  
dispositivo removible hasta  
rodilla

*Si está contraindicado o no se tolera*

Infección **MODERADA + Isquemia MODERADA**  
o  
Infección **SEVERA** o  
Isquemia **SEVERA**

Dispositivo removible hasta  
tobillo

*Si ambos no están disponibles*

Maneje la infección y/o isquemia y  
considere utilizar un dispositivo  
removible según: funcionalidad, nivel  
de actividad y estado ambulatorio del  
paciente

Considere utilizar fieltros de  
descarga con un calzado  
adecuado



### UPD plantar en talón

Considere utilizar un dispositivo de descarga  
hasta la rodilla



*Si la UPD fracasa en la cicatrización*

Considere realizar una intervención  
quirúrgica de descarga tras la  
revaluación del estado vascular