

តើយើងអាចធ្វើចំណាត់ថ្នាក់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលមានជំងឺជ្រាបនៅលើជើងយ៉ាងដូចម្តេច?

កម្រិតនៃការក្លាយ

លក្ខណៈ

ថ្នាំអង់ទីប៊ីយូទិក*

*សូមមើលគោលការណ៍ណែនាំ IWGDF ស្តីពីជំងឺឆ្លងមេរោគនៅជើង

បទបង្ហាញតាមបែបគ្លីនិក

១ ជំងឺជ្រាប កម្រិតមិនធ្ងន់ធ្ងរ (IDSA^a)-PEDIS^b 2

- ត្រូវមានរោគសញ្ញានៃការរលាកយ៉ាងតិចចំនួន២
- ហើម ឬ សភាពរឹង
 - ការឡើងក្រហម > 0.៥cm
 - សភាពទន់ ឬ ឈឺចាប់
 - ឡើងកម្ដៅ
 - ខ្លះ៖

ការព្យាបាលដោយលេបថ្នាំ



២ ជំងឺជ្រាប កម្រិតមធ្យម (IDSA)- PEDIS 3/3 ក្លាយស៊ីដល់ឆ្អឹង

- ក្លាយឡើងក្រហម > ២cm
- ទម្រង់ដែលទាក់ទងនឹងការក្លាយស៊ីជ្រៅជាងស្បែក
- មិនមានសញ្ញាបង្ហាញទៅលើរូបកាយទាំងមូល

ការព្យាបាលដោយលេបថ្នាំឬបញ្ចូលតាមសន្ថែម



៣ ជំងឺជ្រាប កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ (IDSA)- PEDIS 4/4 ក្លាយស៊ីដល់ឆ្អឹង

- សីតុណ្ហភាព > ៣៨°C ឬ < ៣៦°C
- ចង្កាក់បេះដូង > ៩០ ចង្កាក់ / នាទី
- ចង្កាក់ដង្ហើម > ២០ ដង្ហើម / នាទី ឬ PaCO2 < ៤.៣ kPa (៣២ mmHg)
- ចំនួនកោសិកាឈាមស > ១២,០០០/mm3 ឬ > ៤,០០០/mm3 ឬ > ១០% immature (band) forms

ការព្យាបាលដោយបញ្ចូលតាមសន្ថែម



^a IDSA: Infectious Disease Society of America
^b PEDIS: Perfusion, Extent, Depth, Infection and Sensation