

Phân độ nặng của nhiễm trùng

Đặc điểm

Kháng sinh *

Xem các khuyến cáo của hướng dẫn điều trị nhiễm trùng để lựa chọn kháng sinh theo kinh nghiệm cho nhiễm trùng bàn chân ĐTĐ

Biểu hiện lâm sàng

1

MỨC ĐỘ NHẸ (IDSA^a)-PEDIS^b 2

Có ít nhất 2 trong các yếu tố:

- Sưng tại chỗ
- Quầng đỏ > 0.5 cm
- Đau tại chỗ
- Nóng tại chỗ
- Chảy mủ

Kháng sinh đường uống



2

MỨC ĐỘ TRUNG BÌNH (IDSA)-PEDIS 3/3O (viêm tủy xương)

- Nhiễm trùng tại chỗ với quầng đỏ >2 cm
- **HOẶC**
- Bao gồm các cấu trúc sâu hơn như da và mô dưới da
- Không có triệu chứng của đáp ứng viêm toàn thân

Kháng sinh đường uống hoặc truyền tĩnh mạch



3

MỨC ĐỘ NẶNG (IDSA)/PEDIS 4/4 O (viêm tủy xương)

- Nhiệt độ >38 °C hoặc <36 °C
- Nhịp tim >90 lần/phút
- Nhịp thở >20 lần/phút hoặc PaCO₂ <4.3 kPa (32 mmHg)
- Số lượng bạch cầu >12,000/mm³, hoặc <4,000/mm³, hoặc >10% bạch cầu non

Kháng sinh tĩnh mạch



^a IDSA: Infectious Disease Society of America

^b PEDIS: Perfusion, Extent, Depth, Infection and Sensation