

मधुमेह के पैर संक्रमण को कैसे वर्गीकृत किया जाए ?

1

हल्का संक्रमण (IDSA^a) – PEDIS^b 2

कम से कम दो की उपस्थिति

- स्थानीय सूजन या संकेत
- पर्विल > 0.5 cm
- स्थानीय कोमलता या दर्द
- स्थानीय गर्मी बढ़ी
- पीप निर्वहन

2

मध्यम संक्रमण (IDSA)-PEDIS 3/3osteomyelitis

- एरिथेमा के साथ स्थानीय संक्रमण > 2 cm
- **OR**
- भागीदारी संरचना त्वचा और चमड़े के नीचे के ऊतकों से अधिक गहरी है
- प्रणालीगत भड़काऊ प्रतिक्रिया का कोई संकेत नहीं

3

गंभीर संक्रमण (IDSA)/PEDIS 4/4osteomyelitis

- तापमान > 38 °C or < 36 °C
- हृदय गति > 90 beats/minute
- श्वसन दर > 20 breaths/minute or PaCO₂ < 4.3 kPa (32 mmHg)
- श्वेत रुधिर कोशिका गणना > 12,000/mm³, or < 4,000/mm³, or > 10% अपरिपक्व (बैंड) रूपों

संक्रमण की गंभीरता

विशेषताएँ

एंटीबायोटिक दवाओं*

* डायबिटिक फुट संक्रमण के लिए इम्पीरियल एंटीबायोटिक आहार के लिए दिशानिर्देश की सिफारिश को देखें

नैदानिक प्रस्तुति

मौखिक एजेंट



मौखिक या प्रारंभिक आंत्रेतर एजेंट



आंत्रेतर एजेंट



^a IDSA: Infectious Disease Society of America

^b PEDIS: Perfusion, Extent, Depth, Infection and Sensation