

1

Infezione **LIEVE** (IDSA<sup>a</sup>)  
PEDIS<sup>b</sup> 2

**Almeno 2 tra:**

- Tumefazione o indurimento locale
- Eritema > 0.5 cm
- Sensibilità o dolore locale
- Calore locale
- Possibile secrezione purulenta

Agenti orali



2

Infezione **MODERATA** (IDSA)  
PEDIS 3/3osteomielite

- Infezione locale con eritema > 2 cm
- OPPURE**
- Coinvolgimento del sottocutaneo
  - Assenza di infiammazione sistemica

Agenti orali o parenterali



3

Infezione **GRAVE** (IDSA)  
PEDIS 4/4osteomielite

- Temperatura >38°C o <36°C
- Frequenza cardiaca >90 battiti/minuto
- Frequenza respiratoria >20 atti/minuto o PaCO<sub>2</sub> >4.3 kPa (32 mmHg)
- Conta dei globuli bianchi >12.000/cc o <4.000/cc, o >10% forme immature

Agenti parenterali



Severità infezione

Caratteristiche

Antibiotici\*

*\*Fare riferimento alle Linee Guida IWGDF per la terapia antibiotica empirica delle infezioni del piede diabetico*

Presentazione clinica

<sup>a</sup> IDSA: Infectious Disease Society of America

<sup>b</sup> PEDIS: Perfusion, Extent, Depth, Infection and Sensation