

Severidad

1

INFECCIÓN **LEVE** (IDSA^a)-PEDIS^b 2

Presencia de al menos dos o más de los siguientes:

- Hinchazón o induración local
- Eritema > 0.5 cm
- Sensibilidad o dolor local
- Aumento de calor local
- Descarga purulenta

2

INFECCIÓN **MODERADA** (IDSA)-
PEDIS 3/3osteomielitis

- Infección local con eritema >2 cm
- Afectación de estructuras más profundas que la piel y los tejidos subcutáneos
- Ausencia de respuesta inflamatoria sistémica

3

INFECCIÓN **SEVERA** (IDSA)/PEDIS
4/4osteomielitis

- Temperatura >38 °C o <36 °C
- Frecuencia cardíaca >90 latidos/minuto
- Frecuencia respiratoria >20 respiraciones/minuto o PaCO₂ <4,3 kPa (32 mmHg)
- Recuento glóbulos blancos >12.000/mm³, o <4.000/mm³, o >10% de formas inmaduras (en banda)

Características

Antibióticos*

* Ver recomendaciones de la Guía de Infección para el manejo mediante antibioterapia empírica de la infección de Pie Diabético

Agentes orales



Agentes orales o parenterales



Agentes parenterales



Presentación clínica

^a IDSA: Infectious Disease Society of America

^b PEDIS: Perfusion, Extent, Depth, Infection and Sensation