

Jak ocenić ciężkość zakażenia stopy cukrzycowej?

Nasilenie zakażenia

1

ŁAGODNE ZAKAŻENIE (IDSA^a)-
PEDIS^b 2

Objawy:

Obecność co najmniej dwu z:

- Miejscowy obrzęk lub naciek
- Rumień > 0,5 cm
- Miejscowa tkliwość lub ból
- Miejscowe wzmożenie ucieplenia
- Ropna wydzielina

2

UMIARKOWANE ZAKAŻENIE
(IDSA)-PEDIS 3/3 osteomyelitis

- Miejscowe zakażenie z rumieniem > 2 cm
- **LUB**
- Zakażenie obejmujące struktury poza skórą i tkanką podskórną
- Brak objawów zakażenia uogólnionego

3

CIĘŻKIE ZAKAŻENIE
(IDSA)-PEDIS 4/4 osteomyelitis

- Temperatura >38 °C lub <36 °C
- Tętno > 90/min.
- Częstość oddechów > 20/min. albo PaCO₂ <4.3 kPa (32 mmHg)
- Leukocytoza >12,000/mm³, lub <4,000/mm³, lub >10% form niedojrzałych (paleczek)

Antybiotyki*

Doustnie

Doustnie lub początkowo pozajelitowo

Pozajelitowo

**Zobacz zalecenia
Wytyczne empirycznego stosowania
antybiotyków w zakażeniu stopy cukrzycowej*

Wygląd kliniczny



^a IDSA: Infectious Disease Society of America

^b PEDIS: Perfusion, Extent, Depth, Infection and Sensation