

如何分级糖尿病足感染？

感染严重度

1

轻度感染 (IDSA^a) - PEDIS^b 2 级

2

中度感染 (IDSA) - PEDIS
3 级/3 (O) 级

3

重度感染 (IDSA) / PEDIS
4 级/4 (O) 级

特征

下列症状存在 2 项及以上：

- 局部肿胀或硬结
- 红斑 > 溃疡周边 0.5 cm
- 局部压痛或疼痛
- 局部发热
- 脓性分泌物

- 红斑从创面边缘延伸 > 2 cm
或
- 比皮肤和皮下组织更深的组织感染
- 无全身炎症反应的体征

- 体温 > 38°C 或 < 36°C
- 心率 > 90 次/min
- 呼吸频率 > 20 次/min 或二氧化碳分压 < 4.3 kPa (32 mmHg)
- 白细胞计数 > $12 \times 10^9/L$ ($12000/mm^3$), 或 < $4 \times 10^9/L$ ($4000/mm^3$), 或未成熟 (杆状核) 形式 > 10%

抗生素*

口服药物

口服或初始注射药物

注射药物

*见感染指南中针对糖尿病足感染经验性抗生素治疗方案的推荐

临床表现



^aIDSA: 美国感染病学会

^bPEDIS: 灌注、范围、深度、感染和感觉