

如何进行足部感觉检查?



询问患者是否感觉到施加的压力、震动或触摸 (“是” / “否”)



第 1 趾

第 1 跖骨头

第 5 跖骨头

在同一测试点重复此过程 2 遍，另外要有 1 次进行没有使用单丝刺激的“虚假”检测（每个测试点共测试 3 次）。



将振动的音叉末端放置在患者第一趾远端趾骨背侧的骨性突起部位（如果患者拇趾缺失，则选择另一趾）。

在同一测试点重复此过程 2 遍，另外要有 1 次进行音叉不振动的“虚假”检测。



第 1 趾

第 3 趾

第 5 趾

✓ 每个位置均有压力觉：患者在 3 次测试中答对 2 次

✗ 每个位置均没有压力觉：3 次答错 2 次

✓ 有震动觉：3 次检测中患者回答正确至少 2 次

✗ 没有震动觉：3 次答错 2 次

✓ 有轻触感觉：两个或两个以上位置感觉到轻触

✗ 没有轻触感觉：两个或两个以上位置没有感觉到轻触

- 将单丝垂直于测试点的皮肤表面，施加足够的压力使其弯曲。
- 持续 2 s 左右。
- 进行此检查所需的时间：双足共 2 分钟。

- 进行此检查所需的时间：双足共 3-5 分钟。

- 检测人员在触摸时不要推、轻拍或戳。
- 持续 1-2 s。
- 进行此检查所需的时间：双足共 2 分钟。